

CIBUĽA - insekticídna ochrana

Mínerka pórová - alternatívne prípravky

Prípravok	Účinná látka	Spôsob účinku	Škodlivosť pre včely	Škodlivosť pre človeka	Koncentrácia v %	dávka na 10 litrov vody	čakacia lehota v dňoch
Reldan 40 EC	chlorpyrifos-methyl ORG	kontaktný	jedovatý	škodlivý	0,12	12 ml	14
Decis EW 50	deltamethrin PYR	kontaktný	neškodný	škodlivý	0,015	1,5 ml	14

Poznámka: prípravky sa aplikujú vo forme postreku podľa signalizácie, prvé ošetrenie cibule sa obvykle vykonáva v druhej polovici apríla alebo začiatkom mája, postrek o 14 dní aspoň 1x zopakujte, do postrekovej kvapaliny použite zmáčadlo, ktoré zabezpečí účinok postrekovej kvapaliny (Agrovital, Silvet L 77)

Strapky

Prípravok	Účinná látka	Spôsob účinku	Škodlivosť pre včely	Škodlivosť pre človeka	Koncentrácia v %	dávka na 10 litrov vody	čakacia lehota v dňoch
Decis EW 50	deltamethrin PYR	kontaktný	neškodný	škodlivý	0,015	1,5 ml	14

Poznámka: ošetrujte porasty po zistení škodcov alebo príznakov napadnutia (drobné striebřisté škvrny na listoch), aplikujte maximálne dva krát za sezónu, do postrekovej kvapaliny použite zmáčadlo, ktoré zabezpečí účinok postrekovej kvapaliny (Agrovital, Silvet L 77)