

**MOLICE**

V posledných rokoch možno pozorovať pomerne vysoký výskyt molíc v porastoch zelenín. Molica skleníková škodí najmä na uhorky, šaláte, rajčiaku, paprike, fazuli, jahodách a okrasných rastlinách a molica lastovičniková len na kapustovej zelenine. Ochrana je pomerne zložitá, pretože škodca má viac generácií do roka, preto je nevyhnutné striedať prípravky aj počas jednej vegetácie. Chemické ošetrovanie sa robí až pri zistení výskytu škodcu. Na jeho monitorovanie sa v skleníkoch odporúča vyvesiť žlté lepové dosky alebo žlté lepové doštičky.

Proti molici skleníkovej v rajčiakoch je povolený prípravok Karate Zeon 5 CS, Mospilan 20, NeemAzal T/S, v uhorkách a tekvici je Karate Zeon 5 a NeemAzal T/S, v kapustovej zelenine je NeemAzal T/S.

Postrek sa odporúča zopakovať minimálne 2-3-krát v intervale 3-5-7 dní. Proti imágam škodcu je možné použiť nižšiu koncentráciu, proti larvám je potrebná vyššia koncentrácia.

Vzhľadom k tomu, že na molicu lastovničkovú na kapustovú zeleninu nie je v súčasnej dobe registrovaný žiadny prípravok, doporučujeme použiť prípravky registrované na kapustovú zeleninu na mlynárika a moru kapustovú (KARATE ZEON 5CS, SPINTOR, STEWARD, DECIS AL, DECIS Protech), ktoré majú účinok aj na molicu lastovničkovú.

Nezabudnúť pridávať do postrekovej kvapaliny zmáčadlo : AGROVITAL, SILWET STAR

Proti molici skleníkovej na paprikách momentálne nie je povolený žiadny prípravok, doporučujeme použiť niektorý z prípravkov proti molici skleníkovej v iných plodinách.

Alternatívne (pri nedostupnosti registrovaného / povoleného prípravku proti moliciam) pri všetkých plodinách a hlavne pri okrasných rastlinách je vo všeobecnosti možné použiť biologické prípravky KaraNimba a NeemAzal.

Floraservis

01.02.2017