

## CIBUĽA - insekticídna ochrana

### Mínerka pórová, Kvetárka cibuľová

Prípravok	Účinná látka	Spôsob účinku	Koncentrácia v %	dávka na 100 m <sup>2</sup>	čakacia lehota v dňoch
<b>Sanium Ultra</b>	deltamethrin PYR	kontaktný	0,05	5 ml	10

**Poznámka:** prípravky sa aplikujú vo forme postreku podľa signalizácie, prvé ošetrovanie cibule sa obvykle vykonáva v druhej polovici apríla alebo začiatkom mája, postrek o 14 dní aspoň 1x zopakujte. POZOR! do postrekovej kvapaliny použite zmáčadlo, ktoré zabezpečí účinok a zabráni stečeniu postrekovej kvapaliny (Agrovital, Silvet Star)

### Strapky

Prípravok	Účinná látka	Spôsob účinku	Koncentrácia v %	dávka na 100 m <sup>2</sup>	čakacia lehota v dňoch
<b>Spintor (povolený)</b>	spinosad	kontaktný	0,04	4 ml	21
<b>Sanium Ultra</b>	deltamethrin PYR	kontaktný	0,05	5 ml	10

**Poznámka:** ošetrojte porasty po zistení škodcov alebo príznakov napadnutia (drobné striebřisté škvrny na listoch), prípravok Sanium Ultra aplikujte maximálne dva krát za sezónu. POZOR! do postrekovej kvapaliny použite zmáčadlo, ktoré zabezpečí účinok a zabráni stečeniu postrekovej kvapaliny (Agrovital, Silvet Star)