

## **Broskyne - ochrana proti kučeravosti listov**

Prípravok	Účinná látka	Spôsob účinku	dávka na 10 litrov vody	čakacia lehota v dňoch
<b>CUPROXAT SC</b>	tribázický síran meďnatý	kontaktný	50 ml	AT
<b>CHAMPION 50 WG</b>	hydroxid meďnatý	kontaktný	20 g	AT
<b>CONTROLPHYT Cu</b>	biologický prípravok	kontaktný	15 - 20 ml	0
<b>CUPROTONIC</b>	biologický prípravok	kontaktný	30 - 40 ml	0
<b>SULKA K</b>	síra	kontaktný	40 ml	AT

**Poznámka:** prvý preventívny postrek v štádiu nalievania sa púčikov. Na tento postrek použijeme buď jeden z uvedených meďnatých prípravkov (Cuproxat, Champion, Controlphyt Cu, Cuprotonic) alebo sírnatý prípravok Sulka; neaplikujeme ich za sebou. V čase postreku sa má teplota pohybovať nad 7 °C. Meďnaté a sírnaté prípravky môžeme použiť len pred vypučaním stromov, pretože by mohli poškodiť rozvíjajúce sa listy. Po vypučaní stromov používame už len organické fungicídy (napr. Signum, Prolectus, Quick Magnicur)

<b>SIGNUM</b>	boscalid + pyraclostrobin	systemový	7,5 g	7
<b>PROLECTUS</b>	fenpyrazamine	systemový	12 g	1
<b>QUICK MAGNICUR</b>	fenhexamid	kontaktný	15 ml	3

**Poznámka:** druhý postrek 10 dní po vypučaní, ale najneskôr tesne pred kvitnutím najmä v prípade daždivého počasia. **POZOR!!!** Po vypučaní stromov používame už len organické fungicídy (napr. Signum, Prolectus, Quick Magnicur), pretože meďnaté a sírnaté prípravky by mohli poškodiť rozvíjajúce sa listy.

<b>FOLICIT</b>	biologický prípravok	kontaktný	50 - 100 ml	0
----------------	----------------------	-----------	-------------	---

**Poznámka:** Folicit je emulgovateľný koncentrát zo sójového lecitínu a slnečnicového oleja, posilňuje a zlepšuje pružnosť bunkovej steny rastlín a plodov, používa sa proti múčnatke a kučeravosti, začína sa používať vo fáze pučania a preventívne počas celej vegetácie. **POZOR** nepoužívať počas kvitnutia!!!!!! dávkovanie prípravku na choroby (kučeravosť, múčnatka, taphrina, alternaria a iné hubové ochorenia) je 50-100ml na 10l vody, interval aplikácie je podľa potreby každých 5-7 dní.

### **Doplnková ochrana**

<b>IMUNOFOL</b>	biologický prípravok		30 - 50 ml	0
-----------------	----------------------	--	------------	---

**Poznámka:** optimalizuje výživu rastlín zinkom. Vodorozpustný zinok je vo forme komplexu s kyselinou octovou, chitosanom a aminokyselinami, obmedzuje výskyt a zvyšuje odolnosť rastlín voči bakteriálnym, vírusovým a hubovým chorobám (vrátane kučeravosti listov broskyň), prípravok treba aplikovať na začiatku vegetačného obdobia, kedy je už dobre vyvinutá listová plocha ošetrovaných rastlín, aplikuje sa 3-8 krát v 7-10 dňových intervaloch počas vegetácie, **POZOR** nepoužívať počas kvitnutia!!!!!!