

Broskyne - ochrana proti kučeravosti listov

Prípravok	Účinná látka	Spôsob účinku	dávka na 10 litrov vody	čakacia lehota v dňoch
CUPROXAT SC	tribázický síran meďnatý	kontaktný	50 ml	AT
CHAMPION 50 WG	hydroxid meďnatý	kontaktný	20 g	AT
CONTROLPHYT Cu	biologický prípravok	kontaktný	15 - 20 ml	0
CUPROTONIC	biologický prípravok	kontaktný	30 - 40 ml	0
SULKA K	síra	kontaktný	40 ml	AT

Poznámka: prvý preventívny postrek v štádiu nalievania sa púčikov. Na tento postrek použijeme buď jeden z uvedených meďnatých prípravkov (Cuproxat, Champion, Controlphyt Cu, Cuprotonic) alebo sírnatý prípravok Sulka; neaplikujeme ich za sebou. V čase postreku sa má teplota pohybovať nad 7 °C. Meďnaté a sírnaté prípravky môžeme použiť len pred vypučaním stromov, pretože by mohli poškodiť rozvíjajúce sa listy. Po vypučaní stromov používame už len organické fungicídy (napr. Signum, Prolectus, Quick Magnicur)

SYLLIT 544 SC	dodine	kontaktný	16,5 ml	75
alternativy				
SIGNUM	boscalid + pyraclostrobin	systémový	7,5 g	7
PROLECTUS	fenpyrazamine	systémový	12 g	1
QUICK MAGNICUR	fenhexamid	kontaktný	15 ml	3

Poznámka: druhý postrek a ďalšie 10 dní po vypučaní, ale najneskôr tesne pred kvitnutím najmä v prípade daždivého počasia. **POZOR!!!** Po vypučaní stromov používame už len organické fungicídy (napr. Syllit alternatívne Signum, Prolectus, Quick Magnicur), pretože meďnaté a sírnaté prípravky by mohli poškodiť rozvíjajúce sa listy.

FOLICIT	biologický prípravok	kontaktný	50 - 100 ml	0
----------------	----------------------	-----------	-------------	---

Poznámka: Folicit je emulgovateľný koncentrát zo sójového lecitínu a slnečnicového oleja, posilňuje a zlepšuje pružnosť bunkovej steny rastlín a plodov, používa sa proti múčnatke a kučeravosti, začína sa používať vo fáze pučania a preventívne počas celej vegetácie. **POZOR** nepoužívať počas kvitnutia!!!!!! dávkovanie prípravku na choroby (kučeravosť, múčnatka, taphrina, alternaria a iné hubové ochorenia) je 50-100ml na 10l vody, Interval aplikácie je podľa potreby každých 5-7 dní.

Doplnková ochrana

IMUNOFOL	biologický prípravok		30 - 50 ml	0
-----------------	----------------------	--	------------	---

Poznámka: optimalizuje výživu rastlín zinkom. Vodorozpustný zinok je vo forme komplexu s kyselinou octovou, chitosanom a aminokyselinami, obmedzuje výskyt a zvyšuje odolnosť rastlín voči bakteriálnym, vírusovým a hubovým chorobám (vrátane kučeravosti listov broskyň), prípravok treba aplikovať na začiatku vegetačného obdobia, kedy je už dobre vyvinutá listová plocha ošetrovaných rastlín, aplikuje sa 3-8 krát v 7-10 dňových intervaloch počas vegetácie, **POZOR** nepoužívať počas kvitnutia!!!!!!