

Medvedík obyčajný (Krtonôžka) - ochrana

Na území SR nieje momentálne registrovaný žiadny chemický prípravok na ochranu rastlín proti Medvedíkovi obyčajnému, ktorý by bol povolený pre malospotrebitel'ské použitie.

Prípravok	Účinná látka	Spôsob účinku	koncentrácia v %	dávka na 1 m2	čakacia lehota v dňoch
LIMA ORO 5%	metaldehyde	požerový		0,4 g	AT

Poznámka: účinok uvedených prípravkov zistený na základe pozorovania a skúseností záhradkárov a pestovateľov, atraktant obsiahnutý v prípravku, ktorý zabezpečuje prilákanie slimáka / slizniaka k požerovej návnade je na základe pozorovaní silno príťažlivý aj pre Medvedíka obyčajného (krtonôžku), ktorý je ochotný za touto návnadou vyliezť z pôdy a návnadu na slimáky zožrať, týmto spôsobom (požerom) sa dostane účinná látka z prípravku do tela škodcu, ktorý vďaka jej pôsobeniu uhynie, práve z tohto dôvodu je zo všetkých prípravkov proti slimákovi odporúčaný proti medvedíkovi prípravok Lima Oro, ktorý obsahuje najväčšie množstvo účinnej látky a je teda schopný odolného škodcu usmrtiť.

Dávkovanie prípravku ako proti slimákovi.

Uvedené informácie nepochádzajú od výrobcov prípravkov ani nie sú laboratórne overené.

Prípravok	Účinná látka	Spôsob účinku	koncentrácia v %	dávka na 100 m2	čakacia lehota v dňoch
RIGHELLO	inokulum mykrohíznych húb	biologický prípravok		200 - 250 g	AT

Poznámka: prípravok s obsahom pôdných baktérií a mykrohízy pôsobí priamo v pôde pri koreňoch a pomáha rastlinám pri ochrane pred pôdnymi škodcami, odporúčané použitie proti medvedíkovi obyčajnému (krtonôžke): aplikácia do pôdy skoro na jar a pred siatim, alebo vysádzaním

NEMASTAR parazitické hlístice	živé organizmy	biologický prípravok		5 mil. na 10m2	AT
--------------------------------------	----------------	----------------------	--	----------------	----

Poznámka: Nematódy-hlístice rodu *Steinernema carpocapsae* sú parazity, ktoré aktívne vyhľadávajú a parazitujú larvy či dospelce škodcov. Infikované larvy do 2-3 dní po parazitácii hynú a v ich karkasoch prebieha vývoj ďalšej generácie nematód. Tak dochádza k redukcii lariev škodcu a zníženie tak jeho výskytu/zdroja v nasledujúcom období. Aplikuje sa postrekom alebo zalievaním.

Prípravok	Účinná látka	Spôsob účinku	koncentrácia v %	dávka na 1 m2	čakacia lehota v dňoch
TALPA RAUS	výťažok semien ricínu	repelentný		50 - 60 g	AT

Poznámka: prípravok rastlinného pôvodu z lisovaných bielkovín semien ricínu obyčajného, obsahuje aj nektoré alkaloidové látky (vrátane ricínu): ich uvoľňovanie do pôdy vytvára zápach, ktorý je veľmi nepríjemný pre medvedíky obyčajné, hlodavce, krty, hrdziaky lesné a myši, nutné zapracovať do pôdy, pre trvalejšie pôsobenie opakovaná aplikácia každých 30-40 dní