

Mušky a škodlivý hmyz v kvetináčoch

Prípravok	Účinná látka	Spôsob účinku	Koncentrácia	dávka na 2 - 2,5 L vody	čakacia lehota v dňoch
MOSPILAN 20 SP	acetamipirid	systémový	0,006	0,6 g	14

Prípravok Mospilan môžete aplikovať formou zálievky proti hmyzu a škodcom nachádzajúcim sa v pôde kvetináčov (rôzne mušky vylietavajúce z pôdy, pandravy a pod.). Taktiež sa môže aplikáciou formou zálievky pôdy v kvetináči v určitej miere nahradiť ošetrovanie priameho postreku rastliny zasadenej v kvetináči (napr. keď nie je možné rastlinu s kvetináčom vyniesť do exteriéru a je nutné ošetriť ju v interiéri). Rastlina je schopná prípravok Mospilan "natiahnuť do seba" pomocou koreňového systému a nakoľko sa prípravok Mospilan šíri v rastlinách, dostane sa cez korene do všetkých častí rastliny, čím zasiahne aj cicavých a žravých škodcov na jej povrchu. Jeden vodorozpustný sáček s 0,6g prípravku Mospilan je potrebné rozpustiť v 2-2,5L vody (ideálne v prázdnej Pet fľaši na ktorú treba nezmazateľnou fixkou napísať "Pozor roztok Mospilan, Nepiť!!!"), Fľašou treba dobre pretrepať, aby sa prípravok dokonale rozpustil. Touto zarobenou tekutinou treba rastliny v kvetináčoch zaliať, ideálne nahradiť jedno z polievaní bežnou vodou. Množstvo zálievky závisí od veľkosti kvetináča, také množstvo, aké používate pri polievaní. Určené množstvo kvapaliny sa snažíme aplikovať (rozliať) ideálne tak, aby sme zasiahli celú plochu pôdy v kvetináči. Aplikácia pri prvých zistených výskytoch.

Uvedená metóda je vhodná len pre aplikáciu v kvetináčoch, alebo iných pestovateľských nádobách.

NEMAPLUS parazitické hlístice	živý organizmus	biologický	5 mil. do 5L vody na 10 kvetináčov	AT
--------------------------------------	-----------------	------------	------------------------------------	----

Nematódy (hlístice) rodu *Steinernema feltiae* sú parazity, parazitujúce v larvách hostiteľských druhov smúťiviek. Infikované larvy smúťiviek sa sfarbia do žltohneda a do 2-3 dní po parazitácii hynú. V ich karkasoch prebieha vývoj ďalšej generácie nematód. Takto dochádza k redukcii napadnutia rastlín smúťivkami. Jedno ošetrovanie výrobkom Nemaplus chráni ošetrovanú plochu zhruba 6 týždňov. V prípade silného napadnutia smúťivkami opakujte ošetrovanie po 2 týždňoch. Úhyn prvých lariev je viditeľný do 3 dní po aplikácii.

EFFETTO	Mykorízne huby a Rizosférne baktérie	biologický	50 ml do 5L vody na 10 kvetináčov	AT
RIGHELLO	Mykorízne huby a Rizosférne baktérie	biologický	5g na 5L substrátu	AT

Prípravky proti vajíčkam a larvám. Produkt obsahujúci spóry vybraných druhov a kmeňov baktérií používaných na aplikáciu do pôdy. Symbiotický účinok pôdných baktérií a mykorízy indukuje v rastline ochranné mechanizmy proti škodcom ako sú drôtovec, kukuričiar, motýľ, medvedíky obyčajné (krtonožky), chrústy, smúťivky, strapky, molice, mravce.