

Nosáčik lieskový - ochrana

Na území SR nieje momentálne registrovaný žiadny prípravok na ochranu rastlín proti nosáčikovy lieskovému, ktorý by bol povolený pre malospotrebitel'ské použitie.

Prípravok	Účinná látka	Spôsob účinku	koncentrácia v %	dávka na 10l vody / 100m ²	čakacia lehota v dňoch
MOSPILAN 20 SP	acetamipirid	systémový	0,025	2,5 g	14
MAVRIK	tau-fluvalinate	kontaktný	0,05	5 ml	30
KARATE ZEON 5 CS	lambda-cyhalothrin	kontaktný	0,015	1,5 ml	28
SPINTOR	spinosad	kontaktný	0,06	6 ml	7
BENEVIA	cyantraniliprole	kontaktný a požerový	0,075	7,5 ml	14
EXIREL	cyantraniliprole	kontaktný a požerový	0,075 - 0,09	7,5 - 9 ml	14
SANIUM ULTRA	deltamethrin	kontaktný	0,06-0,07	6-7 ml	28
NEEMAZAL T/S	azadirachtin	biologický, lokálne systémový	0,15	15 ml	AT
LEPINOX PLUS	Bacillus thuringiensis Ssp.	biologický, požerový	0,1	10 g	AT

Poznámka: Červivosť liesok spôsobuje nosáčik lieskový (Curculio nucum). Je to chrobák s dlhým noscom, ktorý je tak dlhý ako ostatná časť tela.

Prezimuje v pôde v štádiu lariev, ktoré sa kuklia až na jar. Dospelé chrobáky sa začínajú rojiť až v máji a spočiatku poškodzujú mladé, vyvíjajúce sa oriešky, ktoré za daždivého počasia zvyčajne podľahnú moníliovej hnilobe a predčasne opadávajú. Po tomto zrelostnom žere samičky kladú vajíčka jednotlivo do orieškov. Vyliahnuté larvy poškodzujú jadro plodov. Dospelá larva vyhrýzie v stene orieška okrúhly otvor, cez ktorý plod opustí, zavrtáva sa do pôdy a prezimuje. Škodca má za rok len jednu generáciu.

Proti nosáčikovi lieskovému sa chemická ochrana bežne nevykonáva a ani nie sú proti škodcovi registrované žiadne prípravky. V lokalitách, kde sa pravidelne vyskytuje, môžeme liesky ošetriť v čase rojenia dospelých chrobákov bežnými insekticídmi povolenými napr. proti obaľovačovi jablčného. Postrek treba aspoň dvakrát v dvojtyždňových intervaloch zopakovať. Termín prvého postreku si môže každý pestovateľ určiť vo svojej záhrade sám tým spôsobom, že od začiatku mája bude v pravidelných trojdňových intervaloch v skorých ranných hodinách zisťovať sklepaním na podložené plachty prítomnosť chrobákov na lieskach.

Biologické prípravky aplikujeme 2x v odstupe 7-10 dní.

POZOR! do postrekovej kvapaliny pridajte zmáčadlo, ktoré zabezpečí účinok a zabráni stečeniu postrekovej kvapaliny (Agrovital - biologický, Dropfor, Silvet Star).