

Ochrana proti americkej múčnatke na egrešoch

Prípravok	Účinná látka	Spôsob účinku	Koncentrácia v %	dávka na 10 litrov vody	čakacia lehota v dňoch
-----------	--------------	---------------	------------------	-------------------------	------------------------

SULFURUS	síra	kontaktný	0,4 - 0,5	40 - 50 g	AT
-----------------	------	-----------	-----------	-----------	----

Poznámka: Preventívne proti vzniku choroby aplikujte 2x pred pučaním a po vypučaní. Po vypučaní nižšia koncentrácia. Prípravok aplikovať v čase infekčného tlaku choroby alebo pri výskyte prvých príznakov na bobuliach. Maximálny počet aplikácií za rok 6, interval medzi aplikáciami 7-10 dní.

FLORAVITA SiO	biologický prípravok		0,3 - 0,75	30 - 75 ml	AT
----------------------	----------------------	--	------------	------------	----

Poznámka: zabránenie vstupu patogénov americkej múčnatky aj plesni sivej, aplikácia 2x pred kvetom, 2-4x po odkvete najneskôr 14 dní pred zberom

FOLICIT	biologický prípravok		1	100 ml	0
----------------	----------------------	--	---	--------	---

Poznámka: prvý postrek pred kvitnutím, ďalšie postreky po odkvitnutí rastlín, 2-4 aplikácie v intervale 5 dní